

こどもの定期予防接種とスケジュール

	0 か 月	1 か 月	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	10 か 月	11 か 月	1 歳	1 歳 1 か 月	1 歳 2 か 月	1 歳 3 か 月	1 歳 4 か 月	1 歳 5 か 月	1 歳 6 か 月	1 歳 11 か 月	2 歳	2 歳 2 か 月	2 歳 11 か 月	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳
生	ロタウイルス感染症		対象者 【1価：ロタリックス】生後6週～生後24週まで 【5価：ロタテック】生後6週～生後32週まで 接種間隔 【1価：ロタリックス】生後2月から27日以上の間隔で2回経口接種 【5価：ロタテック】生後2月から27日以上の間隔で3回経口接種※																																		
			① ② ③ ※																																		
不	B型肝炎		対象者 生後1歳に至るまでの間にある者 接種間隔 生後2月～9月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回接種した後1回目の注射から139日以上の間隔で1回接種																																		
			① ② ③																																		
不	ジフテリア(D) 百日せき(P) 破傷風(T) 急性灰白髄炎(IPV) ヒブ(Hib)		対象者(1期) 生後2月～90月に至るまでの間にある者 接種間隔 (初回)生後2月～7月の間に開始し、20日以上の間隔で3回 (追加)初回接種終了後、6月～18月の間をおく 2期(DT) 11歳以上13歳未満の者 *標準的な接種期間：11歳～12歳に達するまで																																		
			① ② ③ ④																																		
不	小児の肺炎球菌		対象者 生後2月以上60月に至るまでの間にある者 接種間隔 初回開始時に2月～7月 (初回)生後2月～7月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回 (追加)3回目接種から60日間以上の間隔で生後12月に至った日以降に接種 初回開始時に7月～12月 (初回)生後24月に至るまでの間に27日～標準として56日の間隔で2回 (追加)2回目接種から60日間以上の間隔で生後12月に至った日以降に接種 初回開始時に12月～24月 60日以上の間隔で2回 初回開始時に24月～60月 1回																																		
			① ② ③ ④																																		
			①																																		
			①																																		
生	BCG		対象者 生後1歳に至るまでの間にある者 *標準的な接種期間：生後5月～8月に至るまで 小学校就学前の1年間(年長児)																																		
生	麻疹風疹混合		1期 生後12月～24月に至るまでの間にある者 *標準的な接種期間：1歳～1歳3月を標準としてなるべくはやく 2期 5歳～7歳未満で小学校就学1年前の4月1日～入学する年の3月31日まで(年長児)																																		
			1期 2期																																		
生	水痘		対象者 生後12月～生後36月に至るまでの間にある者 接種間隔 1歳～1歳3月に至るまでに1回接種した後、初回接種終了後、3月以上の間隔をおいて1回 *標準として、初回接種終了後6月から12月に至るまでの間隔をおく																																		
			① ②																																		
不	日本脳炎		1期 生後6月～90月に至るまでの間にある者 接種間隔 (初回)3歳中に6日～標準として28日の間隔で2回 (追加)4歳中(初回接種終了後、6月以上の間隔) *標準として、おおむね1年後 2期 9歳～13歳未満 *標準的な接種期間：9歳～10歳に達するまで																																		
			① ② ③																																		
不	ヒトパピローマウイルス感染症		対象者 小学6年生～高校1年生相当の年齢(女の子) *標準的な接種時期：中学1年生 サーバリックス(2価) 小学6年生～高校1年生相当 1月以上の間隔をおいて2回注射した後、1回目の接種から5月以上かつ2回目の注射から2月半以上 標準：中学1年生 (標準)1月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 ガーダシル(4価) シルガード9(9価) 1月以上の間隔をおいて2回注射した後、2回目の注射から3月以上 (標準)2月の間隔をおいて2回注射した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 シルガード9(9価) 1回目から5月以上の間隔をおいて2回目を接種(標準)1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 ※1回目を15歳未満で接種し、2回目を5か月以上の間隔をおいて接種する合計2回の接種方法でも完了させることができます																																		
			① ② ③ ※																																		
			小学6年生～高校1年生相当 標準：中学1年生																																		

●予防接種での年齢の考え方 民法「年齢に関する法律」によって計算され、誕生日の前日(24時)に新しい月齢となります。
 ・「至るまで」「達するまで」「未満」「至るまでの間」の考え方は、生まれた日の前日を指します。
 例「生後7月に至るまで」：4月1日生まれの方は、7月後の同日11月1日の前日10月31日に生後7月を迎えたと考えます。

●異なった種類のワクチンを接種する場合の接種間隔

注射生ワクチン	
定期予防接種	BCG、麻疹風疹混合、麻疹、風疹、水痘
任意予防接種	おたふくかぜ

27日以上あける → 注射生ワクチン

※月曜日に接種したら、次は4週間後の月曜日以降に受ける

